



### OBJETIVO 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

#### Objetivo 6

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades



**Meta 6 A** Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA

**Meta 6 B** Lograr para el año 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA



**Meta 6 C** Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

#### Estimaciones de la incidencia y prevalencia del VIH América Latina y el Caribe, 1990-2008

##### América Latina



##### Caribe



Fuente: ONUSIDA/OMS

La epidemia del VIH en América Latina aún no se ha detenido ni tampoco revertido y está presente el riesgo de una mayor expansión de la infección entre mujeres, jóvenes e indígenas.

En 2001, el total estimado de nuevas infecciones por el VIH fue de 150.000. En 2008, se registró un total de 170.000 nuevas infecciones, llevando el número de

personas viviendo con VIH a un estimado de 2 millones.

En cambio, en el Caribe la epidemia del VIH parece haberse estabilizado, con un número decreciente de nuevas infecciones. En 2001, el total estimado de nuevas infecciones fue de 21.000.



# OBJETIVOS de DESARROLLO del MILENIO 2010



NACIONES UNIDAS

## HOJA INFORMATIVA

En 2008 se registró un total de 20.000, llevando el número de personas viviendo con VIH a aproximadamente 240.000. Alrededor de tres-cuartos de ellas viven en la República Dominicana y Haití.

En el Caribe, sin embargo, el SIDA es una de las principales causas de muerte entre los adultos entre 15 a 44 años.

Hay evidencia que en Haití y en la República Dominicana la incidencia del VIH entre los jóvenes ha disminuido gracias a las intervenciones que promovieron el uso de condones y a medidas integrales, con elementos de prevención biomédica, cambios de comportamiento y otras destinadas a controlar y revertir la epidemia.

El porcentaje de población en la región con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales fue en promedio algo superior a 50%. Esta cifra es mayor que el promedio mundial.

En los últimos cinco años la cobertura de tratamiento aumentó 10 veces en la región, mientras que Brasil, Chile, Costa Rica y Cuba alcanzaron la meta de acceso universal.

Aunque se han alcanzado logros significativos en la expansión de servicios de tratamiento, prevención y atención a la población con VIH/SIDA, existen importantes desafíos para enfrentar la epidemia:

- Mayor compromiso político y económico;
- Terminar con el estigma y la discriminación de quienes padecen la enfermedad;
- Fortalecer los sistemas de salud y el acceso a atención y tratamiento;

- Implementar estrategias que combinen intervenciones biomédicas y de conductas de la población;
- Invertir en estudios de volumen de población en riesgo e infectada y en investigaciones especializadas sobre los mecanismos de transmisión.

La incidencia del paludismo en América Latina y el Caribe es muy inferior a la de las regiones más afectadas del mundo. Sin embargo, en 21 de los 35 países y territorios miembros de la OPS/OMS hay zonas en que el paludismo se transmite activamente, estimándose que 284 millones de personas están, en diverso grado, expuestas a contraerlo.

En 2008 hubo cerca de 561 mil casos en la región, 53% menos que en 2000. El progreso regional entre 2000 y 2008 fue importante pues las defunciones relacionadas con la enfermedad disminuyeron en 75%.

En 18 de los 21 países en los cuales la enfermedad es endémica, su incidencia se redujo entre 2000 y 2008. En siete de ellos la caída superó el 75%, con lo cual alcanzaron el objetivo del Milenio en esta materia.

La incidencia de la tuberculosis se ha venido reduciendo desde los años ochenta y se espera que la tendencia a la baja se mantenga hasta 2015.

A este descenso ha contribuido la aplicación de la estrategia de tratamiento abreviado y supervisión estricta (TAES) o el de observación directa y corta duración (DOTS). Muchos países están encaminados a cumplir las metas de la Alianza Alto a la TB, que requieren detectar 84% de los casos y tratar exitosamente 87% de ellos en 2015.